

El Mapa Celeste de la Noche

GRATIS* CADA MES PARA QUE EXPLORE, APRENDA Y DISFRUTE EL CIELO NOCTURNO

WWW.SKYPMAPS.COM

HEMISFERIO SUR

OCTUBRE 2009

Calendario del Cielo – Octubre 2009

- 4 Luna llena a las 6:11 TU.
- 6 Mercurio en su mayor elongación, 18° al oeste del Sol (cielo matutino) a la 1h TU. Mag. -0.4, bajo en el E antes del amanecer. El brillante Venus se encuentra cercano. Mag. -3.9.
- 7 La Luna cerca de las Pléyades (cielo matutino) a las 22h TU.
- 8 Mercurio, Venus y Saturno (cielo matutino) se encuentran dentro de un círculo de 5.8° a las 7h TU (a 20° del Sol).
- 11 La Luna en Cuarto Menguante a las 8:56 TU.
- 12 La Luna muy cerca de Marte (cielo matutino) a la 1h TU. Mag. +0.7. Ocultación visible desde el sur del Océano Índico.
- 12 La Luna cerca del cúmulo Beehive (M44) (a 72° del Sol, cielo matutino) a las 18h TU.
- 13 Venus a 0.52° SSO de Saturno (a 22° del Sol, cielo matutino) a las 10h TU. Mags. -3.9 y +1.1.
- 13 La Luna en perigeo (más cercana a la Tierra) a las 12h TU (369,067 Km.; 32.4°).
- 14 La Luna cerca de Regulus (a 51° del Sol, cielo matutino) a las 7h TU.
- 16 La Luna cerca de Saturno (a 25° del Sol, cielo matutino) a las 7h TU. Mag. +1.1.
- 16 La Luna cerca de Venus (a 21° del Sol, cielo matutino) a las 14h TU. Mag. -3.9.
- 18 Luna Nueva a las 5:32 TU. Inicio de la lunación 1074.
- 21 La lluvia de estrellas Oriónidas alcanza su máximo. Proviene del campo de despojos del Cometa Halley. Activa desde Octubre 2 a Noviembre 7. Produce meteoros muy rápidos (66 Km./seg.), y generalmente débiles (20 por hora). Observe en las horas previas al amanecer del 21 de Octubre; la radiante se localiza cerca del asterismo en forma de "mazo" que se encuentra en Orión. Este año existen condiciones de visibilidad favorables.
- 21 La Luna muy cerca de Antares (cielo nocturno) a las 16h TU. Ocultación visible desde Europa, NO de África y NO de Turquía.
- 25 La Luna en apogeo (más lejana de la Tierra) a las 23h TU (distancia 404,166 Km.; tamaño angular 29.6').
- 26 La Luna en Cuarto Creciente a las 0:41 TU.
- 27 La Luna cerca de Júpiter (cielo nocturno) a las 6h TU. Mag. -2.5.


Más eventos del cielo y ligas en <http://Skymaps.com/skycalendar/>

Todas las horas en Tiempo Universal (TU). Horario de Verano del Este de los EE.UU.=TU-4 horas.



Noches de Galileo

22-24 Octubre 2009
Año Internacional de la Astronomía 2009
<http://www.galileannights.org/>



EL MAPA CELESTE MUESTRA CÓMO SE VE EL CIELO A

INICIOS DE OCT 9 PM
FINALES DE OCT 8 PM

(+1 hora para el Horario de Verano)
MAPA CELESTE DIBUJADO PARA UNA LATITUD 35° SUR. ES ADECUADO PARA LATITUDES DE HASTA 15° AL NORTE O AL SUR DE ÉSTA.

Símbolos

- Galaxia
- Estrella Doble
- Estrella Variable
- Nebulosa Difusa
- Nebulosa Planetaria
- Cúmulo Estelar Abierto
- Cúmulo Estelar Globular

Magnitudes Estelares -1 0 1 2 3 4

Copyright © 2000-2009 Kym Thalassoudis. All Rights Reserved.

* TÉRMINOS DE USO: GRATUITO PARA USO EDUCATIVO NO COMERCIAL. LOS GRUPOS DE EDUCACIÓN ASTRONÓMICA PUEDEN OBSEQUIAR LIBREMENTE COPIAS IMPRESAS. DETALLES COMPLETOS EN <http://Skymaps.com/terms.html>

Traducido por Alfredo González Sosa, Mexico City, Mexico.

Sobre los Objetos Celestes

Enlistados en esta página se encuentran algunos de los objetos celestes más brillantes y más interesantes visibles en el cielo nocturno de este mes (refiérase al mapa celeste mensual). Los objetos están agrupados en tres categorías. Aquellos que pueden ser vistos fácilmente a simple vista (esto es, sin ayuda óptica), los que son fácilmente visibles con binoculares y aquellos que requieren de un telescopio para ser apreciados. **Nota. Todos los objetos (con excepción de las estrellas solas) aparecerán más impresionantes cuando se ven a través de un telescopio o de binoculares muy grandes.** Se agrupan de esta forma para resaltar los objetos que pueden ser vistos usando el equipo óptico que pueda estar disponible al observador del cielo.

Tips para Observar el Cielo Nocturno

Cuando se observa el cielo nocturno, y en particular los objetos de espacio profundo tales como cúmulos estelares, nebulosas y galaxias, siempre es mejor hacerlo desde un lugar oscuro. Evite la luz directa proveniente de la calle o de otras fuentes. Si es posible, observe desde un lugar oscuro lejos de la contaminación de la luz que rodea a la mayoría de las grandes ciudades actuales.

Podrá ver más estrellas después de que sus ojos se adapten a la oscuridad –habitualmente alrededor de 10 a 20 minutos después de que salga. También, si requiere utilizar una lámpara para ver el mapa celeste, cúbrala con celofán de color rojo. Esto conservará la adaptación de sus ojos a la oscuridad.

Finalmente, aunque la Luna es uno de los objetos más impresionantes para ver a través del telescopio, su luz es tan brillante que ilumina el cielo y hace que los objetos más débiles sean más difíciles de ver, por lo que trate de observar el cielo nocturno durante las noches sin Luna, ya sea en Luna Nueva o en Cuarto Menguante.

Glosario de Astronomía

Año Luz (al) – La distancia que un rayo de luz viaja a 300,000 km/seg en un año.

Cúmulo Estelar Abierto – Un grupo de decenas o cientos de estrellas relativamente jóvenes.

Cúmulo Estelar Globular – Un grupo, en forma de esfera, de algunos miles de estrellas viejas.

Conjunción – La alineación de dos cuerpos celestes de tal forma que presentan la menor separación angular cuando se ven desde la Tierra.

Constelación – Un área definida del cielo que contiene la forma de un grupo de estrellas.

Eclíptica – El camino que sigue el centro del Sol en la esfera celeste, visto desde la Tierra.

Elongación – La separación angular de dos cuerpos celestes. Para Mercurio y Venus la mayor elongación ocurre cuando están a su mayor distancia angular del Sol vista desde la Tierra.

Estrella Doble – Dos estrellas que aparecen cercanas una de la otra en el cielo, ya sea ligadas por la gravedad que hace que ambas orbiten una alrededor de la otra (estrella binaria) o que se encuentran a diferentes distancias de la Tierra (doble óptica). La separación aparente de las estrellas se proporciona en segundos de arco (").

Estrella Variable – Una estrella que cambia la magnitud de su brillo durante un período de tiempo.

Galaxia – Una masa de hasta varios miles de millones de estrellas mantenidas juntas por efecto de la gravedad.

Magnitud – El brillo de un objeto celeste como aparece en el cielo.

Nebulosa Difusa – Una nube de gas iluminado por estrellas cercanas a ésta.

Nebulosa Planetaria – Los restos de una cubierta de gas despedida por una estrella.

Oposición – Cuando un cuerpo celeste se encuentra opuesto al Sol en el cielo.

Tiempo Universal (TU) – Un sistema de medición de tiempo utilizado por los astrónomos. También conocido como Hora del Meridiano de Greenwich. La Hora Estándar del Este de los Estados Unidos de Norteamérica (por ejemplo, Nueva York) está 5 horas atrás del TU.

HEMISFERIO SUR
OCTUBRE 2009

OBJETOS CELESTES

☆
☆
☆
☆
Sky maps .com

Fácilmente Visibles a Simple Vista

Altair	Aql	● La estrella más brillante en Aquila. Su nombre significa "El águila en vuelo". 16.8 al.
Canopus	Car	● Segunda estrella más brillante del cielo. 14,000 veces más luminosa que el Sol. 309 al.
β Centauri	Cen	● Con Alfa Centauri, forma el llamado "Puntero a la Cruz". 525 al.
α Centauri	Cen	● La est. más cercana al Sol. 4.4 al. En el telescopio brillante est. doble. Período de 80 años.
Coalsack	Cru	◆ La nebulosa oscura más famosa observable a simple vista. Requiere de cielos oscuros. 600 al.
Deneb	Cyg	● Estrella más brillante en Cygnus. Supergigante de las más grandes conocidas. 1,400±200 al.
Achernar	Eri	● La est. más brillante en Eridanus, El Río. Nombre Árabe. Significa "el final del río". 144 al.
Fomalhaut	Psa	● La estrella más brillante en Piscis Austrinus. En Árabe significa "boca de pez". 25 al.
Antares	Sco	● Estrella supergigante roja. Su nombre significa "rival de Marte". 135.9 al.

Fácilmente Visibles con Binoculares

M31	And	○ La Galaxia Andrómeda. El objeto más distante visible a simple vista. 2.5 millones de al.
M2	Aqr	⊕ Parece una estrella difusa a través de binoculares.
η Aquilae	Aql	● Brillante Cefeida variable. Su magnitud varía entre 3.6 y 4.5 en 7.166 días. 1,200 al.
6397	Ara	⊕ Se piensa que es el cúmulo globular más cercano. 7,000 al.
Mira	Cet	● Famosa estrella variable de largo período. Su magnitud varía entre 3.0 y 10.1 durante 332 días.
χ Cygni	Cyg	● Estrella gigante roja pulsante de largo período. Su magnitud varía entre 3.3 y 14.2 durante 407 días.
M39	Cyg	○ Puede ser observable a simple vista bajo buenas condiciones. 900 al.
GNM	Dor	○ La Gran Nube de Magallanes. Una galaxia vecina de la Vía Láctea. 180,000 al.
IC 4665	Oph	○ Cúmulo abierto grande y disperso. Visible con binoculares.
6633	Oph	○ Cúmulo abierto disperso. Visible con binoculares.
κ Pavonis	Pav	● Tipo Cefeida. Su magnitud varía entre 3.9 y 4.8 durante 9.088 días.
6752	Pav	● Uno de los mejores cúmulos globulares en el cielo. 14,000 al.
M15	Peg	● El único c. glob. que se sabe contiene una neb. planetaria (Mag 14, d=1"). 30,000 al.
ζ Phoenicis	Phe	● Estrella binaria eclíptica y doble (mag 8). Varía entre 3.9 y 4.4 durante 1.667 días.
M8	Sgr	□ La Nebulosa Laguna. Brillante nebulosa bisectada por una banda oscura. 5,200 al.
M25	Sgr	○ Brillante cúmulo localizado a aprox. 6 grados al norte de "La tapa de la tetera". 1,900 al.
M22	Sgr	● Un espectacular cúmulo estelar globular. Un telescopio mostrará sus estrellas. 10,000 al.
M4	Sco	⊕ Un cúmulo globular cercano. Puede ser visible sin ayuda óptica. 7,000 al.
6231	Sco	○ Fácilmente visible con binoculares. 5,900 al.
M6	Sco	○ Cúmulo Mariposa. Más de 30 estrellas visibles en binoculares de 7x. 1,960 al.
M7	Sco	○ Magnífico cúmulo abierto. Observable a simple vista. Edad=260 millones de años. 780 al.
253	Scl	○ Gran galaxia en forma de puro. Miembro del grupo de galaxias del Escultor.
47 Tucanae	Tuc	● Espectacular. El telescopio revelará las estrellas. Al límite de la P.N. de Magallanes. 15,000 al.
β Tucanae	Tuc	● Est. múltiple compleja. Un par visible con binoculares. Telescopio necesario para separar a la est. primaria.
PNM	Tuc	○ Pequeña Nube de Magallanes. Galaxia compañera de la Vía Láctea. 210,000 al.
Cr 399	Vul	○ Asterismo Coathanger o "Cúmulo de Brocchi". No es un cúmulo estelar real. entre 218 y 1,140 al.

Objetos Telescópicos

7009	Aqr	◆ Nebulosa Saturno. Requiere un telescopio de 8 pulgadas ver sus apéndices como los de Saturno.
7293	Aqr	◆ Nebulosa Hélix. Se extiende casi 1/4 de grado. Requiere cielos oscuros. 300 al.
g Arietis	Ari	● Impresionante estrella doble azul-blanca. Visible con un telescopio pequeño. Sep=7.8".
Albireo	Cyg	● Bella estrella doble. Colores contrastantes de naranja y azul-verde. Sep=34.4".
61 Cygni	Cyg	● Atractiva estrella doble. Enanas naranjas de magnitudes 5.2 y 6.1. 11.4 al. Sep=28.4".
γ Delphini	Del	● Amarilla y blanca. Mags. 4.3 y 5.2. 100 al. En el mismo campo se ve la est. doble Struve 2725.
2070	Dor	□ Nebulosa de la Tarántula. Brillante. Localizada en la G.N. de Magallanes. Es una región de formación de est.
θ Eridani	Eri	● Impactante est. doble azul-blanca. Mags 3.2 y 4.3. Visible con un telescopio pequeño. Sep=8.2".
5822	Lup	○ Cúmulo grande y atractivo. 1,800 al. El cúmulo abierto NGC 5823 se encuentra al sur.
M57	Lyr	◆ Nebulosa del Anillo. Objeto magnífico con forma de anillo de humo. 4,100 al.
M23	Sgr	○ Cúmulo estelar elongado. Se necesita de un telescopio para ver las estrellas que lo forman. 2,100 al.
M20	Sgr	□ La Nebulosa Trífida. Un telescopio muestra 3 bandas de polvo trisectando la nebulosa. 5,200 al.
M21	Sgr	○ Un bello e impresionante cúmulo. 4,200 al.
M17	Sgr	□ La Nebulosa Ómega. Contiene el cúmulo estelar NGC 6618. 4,900 al.
6124	Sco	○ Contiene 5 estrellas brillantes estrechamente reunidas cerca del centro. Muestra una cadena de 7 estrellas. 1,600 al.
M11	Sct	○ Cúmulo del Pato Salvaje. Parece un cúmulo globular a través de binoculares. En forma de V. 5,600 al.
M16	Ser	□ La Nebulosa del Águila. Se necesita una telescopio de gran apertura. 8,15 al.
M27	Vul	◆ Nebulosa Dumbell. Grande, con forma de dos lóbulos. La nebulosa planetaria más espectacular. 975 al.